

# Ervaringen met DAA-behandelingen bij patiënten die verslavingszorg ontvangen.

## Hepatitis C in de verslavingszorg

(Ex-)harddrugsgebruikers zijn een belangrijke risicogroep voor hepatitis C. Door middel van doorbraakprojecten wordt gewerkt aan verbetering van hepatitis C in de verslavingszorg en de doorverwijzing naar een hepatitis C behandelcentrum. Meer informatie vindt u op: [www.hepcverslaving.nl](http://www.hepcverslaving.nl)

## DAA-behandeling

De behandeling voor hepatitis C is sinds oktober 2015 sterk verbeterd door de komst van nieuwe medicatie, de zogenaamde Direct Acting Antiviral's (DAA's). De ervaringen uit onderzoek naar deze middelen zijn positief, maar doorgaans ontbreekt hierin de ervaring van één van de grootste risicogroepen, (ex)harddrugsgebruikers.

## Enquête

Alle 45 hepatitis behandelcentra in Nederland zijn in juni 2016 benaderd met een korte vragenlijst. Daarin werd gevraagd naar hun ervaringen met het behandelen met DAA's van patiënten die verslavingszorg ontvangen sinds oktober 2015. De resultaten van deze enquête zijn in deze infographic gepresenteerd.

## Respons



- Ingevlude vragenlijst retour
- Ingevlude vragenlijst retour, geen ervaring
- Geen ingevulde vragenlijst retour




# 33%

Eén centrum heeft nog geen ervaring met het behandelen van patiënten die verslavingszorg ontvangen, maar wel één patiënt die bezig is met het voortraject alvorens medicatie opgestart kan worden.

## Sustained Viral Response (SVR)

Aantal patiënten die zijn gestart met een DAA-behandeling en een Sustained Viral Response (SVR) hebben bereikt.




Van de 15 centra die de vragenlijst invulden hebben 14 centra ervaring met de behandeling van deze patiëntengroep met DAA's. Per centrum zijn 3 tot 30 patiënten gestart met een DAA-behandeling sinds oktober 2015.

Ten tijde van de enquête hadden per centrum 3 tot 28 patiënten een Sustained Viral Response (SVR) bereikt. De meeste centra zien hierin geen verschil met andere patiëntengroepen. Twee centra gaven aan dat de aantallen te klein waren om iets over het verschil in SVR te kunnen melden.

"Mogelijk liggen de aantallen hoger, ik weet niet van iedere patiënt of deze wel / niet bekend is bij verslavingszorg"

## Verskil in bijwerkingen

Wordt er een verschil gezien in bijwerkingen tussen deze patiëntengroep en andere patiënten die een DAA-behandeling ontvangen?



Waar een verschil wordt waargenomen, worden meer bijwerkingen op psychisch vlak genoemd: depressie, neigingen tot psychoses, meer zucht, niet lekker voelen, stemmingswisselingen, slaapstoornissen en vermoeidheid. Een enkel centrum wijdde deze bijwerkingen aan het gebruik van ribavirine.

"Met name de beleving, met daarbij de draagkracht van patiënt, maakt dat sommige patiënten de bijwerkingen heftiger ervaren dan de grote groep patiënten die bijwerkingen als mild omschrijven."

"Patiënten zijn door de behandeling veel meer bezig met de ziekte (hepatitis C), waardoor zij veel meer op hun eigen lichaam lijken te letten. Hierdoor lijken lichamelijke en geestelijke klachten veel meer op de voorgrond te komen."


## Andere opvallende punten

- "Vaak hoog gemotiveerde patiënten."
- "Therapietrouw lijkt goed."
- "Meer controle op inname medicatie mogelijk wanneer patiënt bekend is bij de verslavingszorg (bijvoorbeeld uitgifte van DAA's in combinatie met methadonverstrekking)."

- "Tegelijkertijd nuttigen van alcohol vormt soms een belemmering voor het starten van DAA's."
- "Veel aandacht nodig om te voorkomen dat de dure medicatie niet verloren raakt."
- "Van hele goede momenten en heel positief over de behandeling ineens naar het heel moeilijk vinden en moeite om geen terugval te krijgen."
- "Verwijzing en behandeling van patiënten die klinisch in de verslavingszorg zitten wordt uitgesteld, omdat de kosten voor medicatie op de verslavingskliniek worden verhaald. Klinieken hebben hier geen budget voor."

## Samenwerking

### Samenwerking met verslavingszorg



Bij alle 14 centra is er een vorm van samenwerking met de verslavingszorg. In de helft van de gevallen verwijst de verslavingszorg patiënten door én is betrokken bij de begeleiding van patiënten. Eén van deze centra geeft aan dat er bovendien een goed functionerend zorgpad is.

